

NOM :  
DATE :

## Critères de Spondylarthropathies de l'ESSG

### Intérêt

La sensibilité de ces critères pour le diagnostic de spondylarthropathies est de 87% et la spécificité de 96%.

### Calcul

Il faut un critère majeur **et** un critère mineur pour remplir les critères de classification.

#### CRITERES MAJEURS

**1. Synovites** (passées ou présentes) asymétriques ou prédominant aux membres inférieurs

**ou**

**2. Douleurs du rachis lombaire, dorsal ou cervical** (passées ou présentes) : présence des 3 à 5 critères suivants :

- début avant 45 ans
- début progressif
- améliorées par l'exercice
- raideur le matin
- depuis plus de 3 mois

#### CRITERES MINEURS

1. ATCD familiaux de spondylarthrite, psoriasis, uvéite, arthrite réactionnelle ou entérocolopathie.
2. Psoriasis (antécédent ou en cours) objectivé par un médecin.
3. Infection génitale ou digestive (un mois avant arthrite).
4. Entérocolopathie (antécédent ou en cours, de Crohn ou Rectocolite hémorragique)
5. Enthésopathie (achilléenne ou plantaire)
6. Douleur des fesses à bascule
7. Sacro-iliite radiologique (stade 2-4 bilatéral ou 3-4 unilatéral selon la cotation suivante : 0= normal ; 1= possible ; 2= modérée ; 3= évoluée, 4= ankylose )

### Référence

Amor B., Dougados M.; Mijiyawa M. : Critères diagnostiques des spondylarthropathies. Rev Rhum 1990; 57 :85-9